

# QF Fosfi-K

## Fosfito de Potasio

**USO:** Inductor de resistencia.

**PROPIEDADES:** Fosfito de potasio de fácil absorción y desplazamiento que potencializa las defensas naturales de las plantas frente a enfermedades y previene las podredumbres en condiciones de alta humedad relativa.

La acción del ión fosfito induce a las plantas a crear autodefensas naturales que se conocen con el nombre de fitoalexinas. Estas sustancias tienen una acción preventiva sobre enfermedades provocadas por los hongos patógenos que atacan a las plantas.

El fosfito no solamente aporta su capacidad de suspender el crecimiento y el desarrollo de los hongos, o la germinación de sus esporas (efecto fungistático), sino que además aumentan el valor nutritivo del ion acompañante K.



GARANTÍA DE COMPOSICIÓN	
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40.00 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20.00 %
Aminoácidos	5.00 %

**RECOMENDACIONES DE USO:** En general, para mantener y estimular las defensas de la planta, cualquier momento durante su desarrollo es adecuado para aplicar **QF Fosfi-K**, por lo que se recomienda ajustar la aplicación de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cultivo.

Cultivo	(ml/100 L agua)	Época de aplicación
Jitomate, tomate de cáscara, chile, papa, pimiento. Cebolla, ajo Melón, sandía, pepino, calabacita.	500-750	Una aplicación cada 15 días iniciando a los 45 días después del trasplante.

Lechuga, brócoli, col, coliflor	500-750	Realizar 2 aplicaciones iniciando 20 días después del trasplante a intervalo de 15 días.
Manzana, durazno, Guayaba Mango, limón, naranja, toronja, mandarina	500	Realizar 3 aplicaciones: 1. Un mes antes del inicio de la floración. 2. Durante la floración. 3. A las 3 semanas posteriores a la floración.
Aguacate	200	Realizar 2 aplicaciones: 1. Un mes antes de inicio de floración. 2. A las 3 semanas de la primera aplicación.
Fresa, Zarzamora, frambuesa	500-750	Aplicar cada 15 días desde el inicio del llenado de fruto.
Papaya	500-750	Aplicar cada 15 días durante el llenado de fruto.
Piña	100	Realizar 3 aplicaciones: 1. Al inicio de siembra. 2. Al inicio de inducción floral. 3. Al 4º. mes después de inducción floral.
Vid	300-400	Realizar 4 aplicaciones a intervalos de 15 días c/u a partir del crecimiento vegetativo hasta el comienzo de la maduración.
Algodón	300	Aplicar antes de la formación de cuadros. Repetir a los 25-30 días.
Maíz, sorgo, trigo, cebada, avena. Frijol, garbanzo, cacahuete, haba, lenteja	250-500	Una aplicación a los 20 días después de siembra.
Ornamentales: Rosa, Gerbera, Crisantemos, Gladiolas	400-700	Una aplicación cada 15 días desde la aparición del primer botón floral y hasta el corte.

**PRESENTACIÓN:** Caja con 12 botellas de 1 litro.  
Caja con 4 garrafas de 4 litros.  
Garrafa de 20 litros.

FORMULADO EN MÉXICO POR:

